

- 4.某女士，23 岁，因葡萄胎住院，给予清宫治疗，术后即将出院，护士告知患者避孕持续时间至少是（ ）
- A.1 年
B.2 年
C.3 年
D.4 年
- 5.有关尿瘘，最常见的发生原因是（ ）
- A.绝经期内分泌功能紊乱
B.发育异常
C.产伤
D.体质虚弱
- 16.羊膜腔穿刺术的穿刺部位通常是在（ ）
- A.耻骨联合与髂前上棘连线的内 1 / 3 处
B.耻骨联合与髂前上棘连线的内 1 / 3 处
C.脐与髂前上棘连线的内 1 / 3 处
D.脐与髂前上棘连线的内 1 / 3 处
- 17.阴道灌洗的适应证应除外的是：（ ）
- A.慢性宫颈炎物理治疗前
B.阴道手术前准备
C.做宫颈刮片前
D.宫颈癌术前消炎治疗
- 8.产后做膝胸卧位的锻炼，可预防和纠正（ ）
- A.子宫后倾
B.盆腔静脉栓塞
C.子宫脱垂
D.张力性尿失禁
- 9.下列不是急性胎儿宫内窘迫行剖宫产指征的是（ ）
- A.胎心率 <120 次 / 分，伴羊水 II 度污染
B.羊水 III 度污染
C.胎儿头皮血 pH <7.20
D.胎心监护反复出现早期减速
- 10.协调性子宫收缩乏力的临床表现，错误的是（ ）
- A.有节律性
B.宫颈扩张缓慢
C.宫缩达到高峰时子宫也不硬
D.子宫下段收缩比宫底强
- 11.臀先露者最易发生的并发症是（ ）
- A.胎膜早破
B.胎儿窘迫
C.产后出血
D.子宫破裂
- 12.对出现跨耻征阳性的孕妇，让其取两腿屈曲半卧位，再次检查胎头跨耻征，结果为阴性，提示（ ）
- A.头盆不称
B.骨盆出口狭窄
C.中骨盆狭窄
D.骨盆倾斜度异常
- 13.急产的定义是指总产程短于（ ）

A.5 小时

B.4 小时

C.3 小时

D.2 小时

14.在妊娠期心脏病患者中，下列不是早期心衰体征的是（ ）

A.轻微活动后出现气短、心悸、胸闷

B.休息时心率>110 次 / 分

C.休息时呼吸>20 次 / 分

D.肝脾大，有压痛

15.提示妊娠晚期胎盘功能低下的尿雌三醇结果是（ ）

A.一次 24 小时尿雌三醇值小于 10mg

B.连续多次 24 小时尿雌三醇值小于 10mg

C.一次 24 小时尿雌三醇值小于 15mg

D.连续多次 24 小时尿雌三醇值小于 15mg

16.在出生缺陷的发生中，致畸敏感期是指（ ）

A.胚前期

B.胚胎期

C.胎儿期

D.新生儿期

17. 新生儿面部与全身皮肤呈青紫色；呼吸节律不整且表浅；心跳规则有力，心率 100 次 / 分，肌张力好，肢体屈曲，对外界刺激有反应，喉反射存在。该新生儿属于（ ）

A.正常新生儿

B.轻度窒息

C.中度窒息

D.重度窒息

18.为促进胎肺成熟，可选择的药物是（ ）

A.沙丁胺醇

B.硫酸镁

C.地塞米松

D.保泰松

19.关于分娩时的完全子宫破裂，以下正确的是（ ）

A.子宫底迅速上升

B.大量阴道出血

C.患者全腹部压痛、反跳痛

D.子宫破裂后听不到胎心，也不能触摸到肢体

20.导致前庭大腺炎的常见病原体不包括（ ）

A.梅毒螺旋体

B.葡萄球菌

C.淋菌

D.链球菌

二、多项选择题(本大题共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

21. 诊断胎儿窘迫所用的胎儿生物物理评分法选用的指标包括 ()

- A. 胎儿呼吸样运动
- B. 胎动
- C. 胎儿肌张力
- D. 胎儿反应性
- E. 羊水容量

22. 放置宫内节育器的禁忌证有 ()

- A. 子宫脱垂
- B. 重度宫颈糜烂
- C. 双角子宫
- D. 月经量过多
- E. 心功能 IV 级

23. 母儿血型不合而导致新生儿溶血好发于 ()

- A. 父为 O 型血, 母为 A 型血
- B. 父为 A 型血, 母为 O 型血
- C. 父为 B 型血, 母为 O 型血
- D. 父为 O 型血, 母为 AB 型血
- E. 父为 A 型血, 母为 B 型血

24. 关于胎膜早破, 下列描述正确的是 ()

- A. 胎膜早破发生于临产前
- B. 破膜 12 小时后, 给予抗生素预防感染
- C. 破膜后, 阴道液呈酸性
- D. 破膜 24 小时后, 应立即终止妊娠
- E. 应积极预防脐带脱垂

25. 关于尖锐湿疣的病因病史描述, 正确的有 ()

- A. 由人乳头状瘤病毒感染引起
- B. 大多数通过医用器械传染
- C. 患病半年时传染性最强
- D. 婴儿可以通过与母亲的密切接触传染
- E. 与宫颈癌、外阴癌的发病无关

三、填空题(本大题共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

26. 先天性无阴道的病人如只有痕迹子宫可在婚前 6~12 月行_____术治疗。

27. 妊娠期肝内胆汁淤积症以妊娠期临床上_____、黄疸和病理上胆汁淤积为特征。

28. 妊娠合并病毒性肝炎患者, 产后不宜哺乳者严禁用_____类药物回奶。

- 29.脐带先露或脐带脱垂，若先露部已衔接，胎膜已破，脐带位于胎先露和骨盆壁间，脐带血循环阻断超过 7~8 分钟，则可致_____。
- 30.发生先兆子宫破裂时，子宫下段与宫体之间形成明显的环状凹陷，称为_____。
- 31.轻度头盆不称者试产过程中，胎膜未破者可在宫口扩张_____cm 时行人工破膜。
- 32.妊娠期急性肾盂肾炎多数发生于妊娠_____期或产褥早期，且多因膀胱感染上行所致。
- 33.早产儿由于肺泡组织功能不健全，肺泡 II 型细胞产生的表面活性物质缺乏，容易发生_____综合征。
- 34.刮宫术后未满_____个月者禁做子宫输卵管碘油造影。
- 35.在进行会阴湿热敷时，除了热的作用外，还利用_____的高渗脱水特点而具有较好的减轻水肿的作用。
- 36.短效口服避孕药一般连服 22 天，停药以后 2~3 天就发生_____性阴道出血，犹如月经来潮。
- 37.怀疑子宫内膜脱落不全的功能失调性子宫出血病人，应指导她于月经来潮第_____日进行诊断性刮宫，将子宫内膜送病理检查，以助确诊。
- 38.多数围绝经期妇女经历不同类型的_____后，逐渐进入闭经，而少数妇女可能突然闭经。
- 39.侵蚀性葡萄胎较常见也较早的转移部位是_____，其次是阴道和子宫旁组织，脑转移较少见。
- 40.某女士，27 岁。婚后 3 年不孕，月经周期不规律，妇科检查无异常，基础体温呈单相型，应考虑为_____型功血。

四、名词解释题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

- 41.晚期妊娠引产术
- 42.性激素补充疗法
- 43.异常分娩
- 44.羊水过多
- 45.产后出血

五、简答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

- 46.简述周期性胎心率晚期减速的特点及意义。
- 47.简述妊娠高血压综合征的分类及其临床表现。
- 48.简介我国计划生育的具体内容。
- 49.列举 5 条化疗用药的注意事项。

六、论述题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

- 50.某女工，26 岁，高中毕业，妊 2 产 0，自然流产 1 次。本次妊娠 28 周时确诊为妊娠期糖尿病，产科医生建议她

看内分泌科门诊，但她迟迟未去，理由是：“我现在没有什么不舒服，能吃能喝，胎动也正常，不用治疗吧”。请你根据该孕妇的情况，向她宣教糖尿病对孕产妇、胎儿及新生儿影响的知识。

51.患者李某，女，40岁，中学教师，以“外阴瘙痒2年余，外阴疼痛，结节伴流血10天”就诊。经检查后，医师怀疑是外阴癌，经病理活检确定癌的诊断后，决定给病人行体外放射治疗。在放疗第8天时，病人外阴局部皮肤出现水样渗出，而且部分区域出现溃烂。病人自己感觉放疗后结节有缩小，愿意坚持完一个疗程。为了保持局部清洁，使用了卫生护垫。

请写出：（1）该病人的放疗损伤达到了哪一个程度？

（2）两条主要的护理诊断及相应的护理措施。