



- A.真菌  
B.病毒  
C.金黄色葡萄球菌  
D.支原体
- 5.低血容量性休克病人血容量补足时，尿量应达到每小时（ ）  
A.10ml 以上  
B.30ml 以上  
C.60ml 以上  
D.100ml 以上
- 6.肺毛细血管楔压降低可见于（ ）  
A.心源性休克  
B.急性心脏压塞  
C.肺水肿  
D.血容量不足
- 7.轻度营养不良时，血清白蛋白低于（ ）  
A.20g/L  
B.30g/L  
C.35g/L  
D.40g/L
- 8.某病人被开水烫伤足部，感觉剧痛，可见大水疱，基底潮红，估计该病人烧伤深度为（ ）  
A.I 度  
B.浅 II 度  
C.深 II 度  
D.III 度
- 9.对甲亢的诊断有肯定价值的检查是（ ）  
A.血清 T<sub>3</sub> 和 T<sub>4</sub> 测定  
B.基础代谢率测定  
C.甲状腺 B 超  
D.甲状腺核素扫描
- 10.乳癌最多见于乳房的（ ）  
A.内上象限  
B.内下象限  
C.外下象限  
D.外上象限
- 11.腹部损伤病人的首发症状是（ ）  
A.腹痛  
B.腹胀  
C.发热  
D.呕吐
- 12.肾移植病人术后第 3 天出现发热、畏寒、乏力、食欲减退、白细胞增加，尿量明显减少，应考虑（ ）  
A.超急性排异反应  
B.加速性排异反应  
C.急性排异反应  
D.慢性排异反应
- 13.男性，20 岁，头面颈部、双手及右前臂深 II 度烧伤，其烧伤面积约为（ ）  
A.14%  
B.17%  
C.20%  
D.27%
- 14.硬脑膜外血肿的典型意识改变特点是（ ）

- A.昏迷时间不超过 30 分钟  
B.持续浅昏迷  
C.昏迷—清醒—再昏迷  
D.昏迷进行性加重
- 15.对颅内压调节起主要缓冲作用的是 ( )  
A.脑体积  
B.脑血流量  
C.脑脊液  
D.颅腔容积
- 16.少量血胸是指病人出血量最多不超过 ( )  
A.300ml  
B.500ml  
C.800ml  
D.1000ml
- 17.预后最差的肺癌类型是 ( )  
A.鳞癌  
B.小细胞癌  
C.腺癌  
D.大细胞癌
- 18.确诊食管癌的主要检查方法是 ( )  
A.X 线钡剂造影  
B.食管脱落细胞学检查  
C.内镜检查  
D.CT
- 19.上尿路结石最常见的类型是 ( )  
A.草酸钙结石  
B.磷酸钙结石  
C.尿酸结石  
D.胱氨酸结石
- 20.前列腺增生病人简便而重要的诊断方法是 ( )  
A.直肠指诊  
B.尿流率测定  
C.B 超  
D.PSA 测定
- 21.膀胱全切直肠代膀胱病人易出现的电解质酸碱失衡的类型是 ( )  
A.低氯性碱中毒  
B.高氯性酸中毒  
C.低氯性酸中毒  
D.高氯性碱中毒
- 22.可以用于确诊骨折的临床表现是 ( )  
A.局部压痛  
B.局部功能障碍  
C.局部肿胀  
D.反常活动
- 23.女性,58 岁,急性右上腹阵发性绞痛,伴寒战、高热、黄疸,急诊行胆囊切除、胆总管探查、T 管引流术,术后观察病人排便情况的最主要目的是 ( )  
A.判断胆总管通畅情况  
B.判断肠道功能恢复情况  
C.及时发现有无胃肠道出血  
D.判断对脂肪消化和吸收的能力

- 24.影响骨折愈合的最重要因素是 ( )
- A.病人年龄  
B.骨折固定是否确切  
C.是否达到解剖复位  
D.骨折局部血液供应
- 25.手指断指再植的时间一般要求不超过 ( )
- A.5 小时  
B.6 小时  
C.8 小时  
D.10 小时
- 26.脊髓半横切损伤病人损伤平面以下肢体感觉改变的特点是 ( )
- A.同侧深感觉消失, 对侧痛觉消失  
B.同侧痛觉消失, 对侧深感觉消失  
C.同侧痛觉消失, 对侧温觉消失  
D.同侧温觉消失, 对侧痛觉消失
- 27.全肺切除术后病人留置胸管的目的是 ( )
- A.排出积气  
B.排出积液  
C.平衡纵隔两侧压力  
D.便于观察胸腔内出血
- 28.门静脉高压症最危险的并发症为 ( )
- A.腹水  
B.肝性脑病  
C.脾功能亢进  
D.食管胃底静脉曲张破裂出血
- 29.急性出血性坏死性胰腺炎病人血清淀粉酶和尿淀粉酶的变化规律是 ( )
- A.前者增高, 后者不增高  
B.前者不增高, 后者增高  
C.前者增高先于后者  
D.前者增高迟于后者
- 30.梗阻性疼痛的特点为 ( )
- A.阵发性绞痛  
B.持续性疼痛  
C.牵涉痛  
D.持续性疼痛阵发性加重
- 31.食管癌切除食管胃吻合术后第 5 天, 病人突然出现高热、寒战, 呼吸困难, 胸痛, 首先应考虑病人出现了 ( )
- A.肺炎、肺不张  
B.吻合口瘘  
C.乳糜胸  
D.出血
- 32.肝叶切除术后病人不宜早期下床活动的主要原因是 ( )
- A.防止肝断面出血  
B.防止肝性脑病  
C.有利于病人恢复体力  
D.有利于病人伤口愈合
- 33.结直肠癌最常见的播散方式是 ( )
- A.直接浸润  
B.淋巴转移  
C.血行转移  
D.种植转移

34.必需采用肠外营养支持的是 ( )

- A.昏迷病人  
B.拒绝进食者  
C.急性重症胰腺炎早期病人  
D.低位肠痿病人

35.适合于门诊或小手术后镇痛的方法是 ( )

- A.口服镇痛剂  
B.肌内注射镇痛剂  
C.静脉注射镇痛剂  
D.病人自控止痛法

## 二、填空题 (本大题共 7 小题, 每空 1 分, 共 14 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

36. 多器官功能障碍综合征最主要的临床特征是\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

37. 甲状腺功能亢进病人的主要临床特征是\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

38. 胃十二指肠溃疡常见的并发症包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、胃十二指肠溃疡大出血和胃溃疡癌变。

39. 甲亢病人术前准备中提示甲亢症状得到基本控制的表现情绪稳定、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_，脉率<90 次/分，基础代谢率<20%。

40. 国际通用的格拉斯哥昏迷评分法根据病人的\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和运动反应来判断病人的意识情况。

41. 骨折治疗的三大原则包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和功能锻炼。

42. 胸腔闭式引流装置中水封瓶长玻璃管应没入水中\_\_\_\_\_cm，正常情况下长管内水柱上下波动\_\_\_\_\_cm。

## 三、名词解释题 (本大题共 3 小题, 每小题 3 分, 共 9 分)

43. 脑震荡

44. 要素膳

45. 倾倒综合征

## 四、简答题 (本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

46. 简述胃十二指肠溃疡大出血病人非手术治疗原则。

47. 简述原发性肝癌病人肝动脉插管栓塞化疗后，栓塞后综合征的临床表现和护理要点。

48. 简述低血容量性休克的治疗原则。

49. 简述结肠代食管(食管重建)病人的术后护理要点。

## 五、病例分析题 (本大题共 2 小题, 共 22 分)

50. (本题 12 分) 男性, 45 岁, 有胆石症病史, 近两日表现为持续性右上腹疼痛, 伴寒战高热, 恶心, 呕吐。实验室检查: 白细胞  $21 \times 10^9/L$ , 中性粒细胞比例增高。体检: 巩膜黄染,  $T39^\circ C$ ,  $P120$  次/分,  $BP90/60mmHg$ , 神情淡漠。

问: (1) 此病人最可能的医疗诊断是什么?

(2) 列出三个主要护理诊断/问题。

(3) 列出此病人目前主要的护理措施。

51. (本题 10 分) 男性, 20 岁, 因从高处坠下, 左小腿受伤后肿胀畸形 12 小时, 体检左小腿肿胀明显, 皮肤发亮, 中段可及骨擦感, 被动活动时足趾感剧痛, 左足背动脉搏动减弱。诊断为“左侧胫腓骨骨折”。

问: (1) 此病人目前出现何种并发症?

(2) 此并发症可能的原因是什么?

(3) 列出目前主要的治疗和护理要点。