

4. 对于 4 个月龄的婴儿, 下述情况中应视为异常的是()
- A. 前囟未闭
B. 不能抬起头
C. 不能自己坐稳
D. 不能辨别人声
5. 小儿第一次口服脊髓灰质炎减毒糖丸的年龄是()
- A. 1 个月
B. 2 个月
C. 3 个月
D. 4 个月
6. 极低出生体重儿指的是()
- A. 出生体重在 2500g 以下的新生儿
B. 出生体重在 2000g 以下的新生儿
C. 出生体重在 1500g 以下的新生儿
D. 出生体重在 1000g 以下的新生儿
7. 新生儿呼吸窘迫综合征的主要病因是()
- A. 剖宫产和异常分娩
B. 肺内液体过多
C. 原发性肺不张
D. 肺表面活性物质缺乏
8. 新生儿娩出时, 常用 Apgar 评分来衡量窒息的轻重程度, 如果评分为 2 分, 则提示该患儿()
- A. 正常
B. 轻度窒息
C. 中度窒息
D. 重度窒息
9. 新生儿硬肿症, 硬肿最先发生的部位是()
- A. 面颊部
B. 上肢
C. 臀部
D. 下肢外侧
10. 新生儿颅内出血较重者, 最常见的后遗症是()
- A. 脑积水
B. 癫痫
C. 脑性瘫痪
D. 智力低下
11. 2 岁婴儿体重 8kg, 腹部皮下脂肪 0.3cm, 身高 80cm, 皮肤稍苍白, 肌肉松弛, 爱哭闹, 其营养状况是()
- A. 营养正常
B. 轻度营养不良
C. 中度营养不良
D. 重度营养不良
12. 维生素 D 缺乏性佝偻病, 好发于 3 个月至 2 岁小儿, 临床表现中出现最早的症状是()
- A. 神经精神症状
B. 骨骼改变
C. 肌肉松弛
D. 生长发育迟滞
13. 小儿急性感染性喉炎, 临床表现出的咳嗽特点是()
- A. 干咳无痰的刺激性咳嗽
B. 典型的犬吠样咳嗽

- C. 伴有呕吐的痉挛性咳嗽
D. 改变体位时咳嗽加重
14. 喉炎患儿出现吸气性呼吸困难和喉鸣音, 烦躁不安, 口唇及指趾发绀, 大汗, 双目圆睁、呈恐慌状; 检查肺呼吸音降低, 心率快, 其喉梗阻的分度是()
- A. I 度
B. II 度
C. III 度
D. IV 度
15. 中度脱水, 体液损失量占体重的比例是()
- A. <5%
B. 5%~10%
C. 10%~15%
D. >15%
16. 为适用于不同情况的补液需要, 常把不同溶液按照不同比例配制成混合溶液, 其中 1:1 溶液指的是()
- A. 1 份生理盐水和 1 份 5%~10% 葡萄糖
B. 1 份生理盐水和 1 份 1.4% 碳酸氢钠
C. 1 份生理盐水和 1 份 1.87% 乳酸钠
D. 1 份生理盐水和 1 份 1.2% 氯化钾
17. 引起秋、冬季婴幼儿腹泻的常见病原体是()
- A. 诺沃克病毒
B. 柯萨奇病毒
C. 埃可病毒
D. 人类轮状病毒
18. 正常卵圆孔闭合的时间是()
- A. 出生后 1~2 个月
B. 出生后 3~4 个月
C. 出生后 5~7 个月
D. 出生后 8~10 个月
19. 最常见的先天性心脏病是()
- A. 室间隔缺损
B. 房间隔缺损
C. 动脉导管未闭
D. 肺动脉狭窄
20. 小儿最常见的出血性疾病是()
- A. 过敏性紫癜
B. 继发性血小板减少性紫癜
C. 原发性血小板减少性紫癜
D. 血友病
21. 急性肾小球肾炎给予青霉素肌肉注射治疗的时间是()
- A. 3 天
B. 5~6 天
C. 7~10 天
D. 11~12 天
22. 原发性肾病综合征典型病例的四大临床特点是()
- A. 大量蛋白尿、低白蛋白血症、全身性水肿、高胆固醇血症
B. 高血压、大量蛋白尿、低白蛋白血症、高胆固醇血症
C. 大量蛋白尿、肉眼血尿、全身性水肿、高血压

33. 液体疗法的目的是纠正_____，恢复_____。
34. 脱水是由于_____和(或)_____所致。
35. 法洛三联症是由肺动脉狭窄、_____、室间隔缺损和_____四种畸形组成。
36. 营养性巨幼红细胞性贫血主要是由于缺乏_____和(或)_____所致。
37. 出血性疾病的临床特征是_____或_____。
38. 急性肾小球肾炎一般病例最早出现的症状是_____、_____。
39. 癫痫是一种由于_____异常导致的慢性疾病，临床表现为反复发作的_____。
40. 过敏性紫癜的基本病理改变为较广泛的急性无菌性_____和_____的炎性反应。

三、名词解释题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

41. 青春期
42. 人工喂养
43. 主动免疫
44. 正常足月新生儿
45. 骨髓外造血

四、简答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

46. 简述儿科使用的约束法的注意事项。
47. 简述 NICU 的入室指征。
48. 描述新生儿病理性黄疸的临床特点。
49. 简述急性白血病患儿的处理原则与护理措施。

五、论述题（本大题共 1 小题，15 分）

50. 患儿，男，11 岁，发现眼睑浮肿两天，并伴肉眼血尿，到医院就诊，予抗炎利尿治疗后好转。两周后忽然出现尿量减少，并伴有呕吐，到医院就诊，以“肾炎性肾病、急性肾衰”收入院。目前患儿精神弱，食欲差，每顿只进食约 50ml 左右的流食。查体：颜面部、双下肢及阴囊部水肿明显，BP130/90mmHg。实验室检查：尿量 170ml/d，尿蛋白（++++），血 BUN45.71mmol/L（128mg%）。

根据病例请回答：

- (1) 此患儿发生急性肾衰的病因。
- (2) 写出患儿的 3 个主要护理问题。
- (3) 简述主要护理措施。