

自考网校 免费试听 自考名师 课件更新 报名演示 学习卡



郭建华 韩旺辰 郝玉柱 张旭娟 孙茂竹 白薇

最权威的师资阵容

最及时的在线答疑

全程视频授课，反复观看 不限次数

自考365 网校数百门课程全面招生！

基础班+串讲班 祝您成功每一天！

座位号末二位

|      |  |
|------|--|
| 复核总分 |  |
| 复核人  |  |

二〇〇三年上半年全国高等教育自学考试

儿科学试卷

(课程代码 2906)

|     |    |    |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|----|----|
| 总分  | 题号 | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  |
|     | 题分 | 30 | 10 | 20 | 25 | 15 |
| 合分人 | 得分 |    |    |    |    |    |

第一部分 选择题(共 40 分)

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
|    |     |     |

一、单项选择题(本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

- 小儿体格生长发育的第二高峰是在 **【 】**  
A. 婴儿期      B. 幼儿期      C. 学龄期      D. 青春期
- 小儿身长 85cm,体重为 12kg,最可能的年龄是 **【 】**  
A. 6 月      B. 1 岁      C. 2 岁      D. 3 岁
- 体重 5kg 的婴儿每日需要的热量和水量分别为 **【 】**  
A. 2305KJ(550kcal), 750ml      B. 1150KJ(275kcal), 375ml  
C. 315KJ(75kcal), 550ml      D. 2100KJ(500kcal), 500ml
- 新生儿期能接种的疫苗有 **【 】**  
A. 脊髓灰质炎疫苗 B. 乙肝疫苗      C. 百白破疫苗      D. 麻疹疫苗
- 胎龄 38 周,体重 2200g,称 **【 】**  
A. 适于胎龄儿      B. 足月小样儿      C. 极低体重儿      D. 早产儿

沪 92# 儿科学试卷第 1 页(共 10 页)

6. 我国新生儿败血症特点是 【 】  
A. 以葡萄球菌感染为最常见 B. 产前感染最常见  
C. 有典型的、特异性的临床表现 D. 血培养阴性可排除败血症
7. 新生儿硬肿症的发生是因为 【 】  
A. 新生儿保暖过度 B. 早产儿棕色脂肪含量多  
C. 新生儿体温调节是产热大于散热 D. 缺氧、严重感染抑制棕色脂肪作用
8. 营养不良的早期表现为 【 】  
A. 反应淡漠 B. 体重不增  
C. 面部皮下脂肪开始减少 D. 身长低于正常
9. 维生素 D 缺乏性佝偻病属于骨样组织堆积的临床表现是 【 】  
A. 颅骨软化 B. 方颅 C. 肋膈沟 D. “O”形或“X”型腿
10. 小儿消化系统解剖生理特点 【 】  
A. 小儿出生时唾液腺功能接近成人  
B. 婴儿胃贲门括约肌发育成熟, 幽门括约肌发育不良  
C. 小儿肠相对较成人长, 吸收力强  
D. 不易发生肠扭转和肠套叠
11. 关于鹅口疮正确的是 【 】  
A. 多见于新生儿, 营养不良的患儿 B. 可用红霉素治疗  
C. 口腔内出现溃疡, 分泌物多 D. 全身中毒症状严重
12. 按病原分类的肺炎有 【 】  
A. 慢性肺炎 B. 细菌性肺炎 C. 重症肺炎 D. 支气管肺炎
13. 引起疱疹性咽峡炎的病原是 【 】  
A. 单纯疱疹病毒 B. 腺病毒 C. 柯萨奇病毒 D. 支原体
14. 关于胎儿血循环错误的是 【 】  
A. 右心房血可经卵圆孔入左心房  
B. 动脉导管开放  
C. 通过胎盘交换的动脉血进入脐动脉  
D. 胎儿期供应心, 脑, 肝的血氧量较下半身为高
15. 青紫型先天性心脏病是 【 】  
A. 法洛四联症 B. 房间隔缺损 C. 室间隔缺损 D. 动脉导管未闭

儿科学试卷第 2 页 (共 10 页)

16. 房间隔缺损的病理生理改变为 【 】  
A. 左房、左室扩大 B. 右房、右室扩大  
C. 右房左室扩大 D. 左、右心室扩大
17. 学龄前儿童少尿的标准是 【 】  
A. 24 小时尿量 < 50ml B. 24 小时尿量 < 300ml  
C. 24 小时尿量 < 200ml D. 24 小时尿量 < 400ml
18. 关于泌尿系感染,错误的是 【 】  
A. 最常见的致病菌为大肠杆菌  
B. 最常见的感染途径是上行性感染  
C. 尿路感染每毫升尿细菌数多超过 10 万  
D. 急性感染抗菌素疗程用药 5—7 天
19. 生理性贫血出现的时间是 【 】  
A. 生后第 2—3 天 B. 生后第 2—3 个月 C. 生后 2—3 岁 D. 生后第 6 个月
20. 迟发性维生素 k 缺乏症最常见的出血部位是 【 】  
A. 消化道出血 B. 肺出血 C. 颅内出血 D. 尿路出血
21. 病毒性脑炎的临床表现为 【 】  
A. 无脑膜刺激征 B. 脑脊液蛋白增高,糖、氯化物降低  
C. 有颅内压增高的表现 D. 脑电图正常
22. 脑性瘫痪的临床特点 【 】  
A. 以运动功能障碍为主 B. 以混合型瘫痪最常见  
C. 病因主要为遗传因素 D. 病理改变为脑室缩小
23. 苯丙酮尿症的特点是 【 】  
A. 智力正常 B. 黑色素形成障碍  
C. 新生儿期常不能发现本病 D. 以药物治疗为主
24. 能通过胎盘的免疫球蛋白是 【 】  
A. IgA B. IgM C. IgG D. IgE
25. 过敏性紫癜与血小板减少性紫癜的鉴别点是 【 】  
A. 皮肤出血性皮疹 B. 毛细血管脆性试验阳性  
C. 血小板数正常 D. 肾上腺皮质激素治疗有效

儿科学试卷第 3 页 (共 10 页)

26. 治疗皮肤粘膜淋巴结综合征的首选药物是 **【  】**  
 A. 激素            B. 抗生素            C. 阿司匹林            D. 维生素C
27. 关于结核菌素试验正确的是 **【  】**  
 A. 结核菌素试验阳性属于迟发型变态反应  
 B. 结果阳性提示结核感染  
 C. 结果阴性排除结核感染  
 D. 试验后 20 分钟观察结果
28. 钩虫病引起的贫血特点是 **【  】**  
 A. 大细胞性贫血            B. 慢性失血性贫血  
 C. 铁剂治疗无效            D. 易致呼吸道出血
29. 小儿惊厥首选止惊药物 **【  】**  
 A. 地西洋(安定)    B. 副醛            C. 非那根            D. 氯丙嗪
30. 按血气分析结果呼衰的分类应是 **【  】**  
 A. 呼吸中枢功能衰竭            B. 通气性呼吸功能衰竭  
 C. 低氧血症伴高碳酸血症        D. 呼吸肌功能衰竭

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
|----|-----|-----|
|    |     |     |

二、多项选择题(本大题共 10 小题,每小题 1 分,共 10 分)

在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

31. 关于婴儿期正确的是 **【  】**  
 A. 提倡母乳喂养,按时添加辅食  
 B. 完成各种基础免疫接种  
 C. 生长发育速度较慢  
 D. 定期健康检查,适当体格锻炼  
 E. 开展早期教育,促进神经系统发育
32. 足月新生儿生理性黄疸的特点 **【  】**  
 A. 黄疸多于生后 24 小时内发生  
 B. 于生后 7—14 天内消退  
 C. 血清胆红素水平低于 205 $\mu$ mol/L(12mg/dl)  
 D. 以间接胆红素为主  
 E. 新生儿仅表现为嗜睡,吃奶差

儿科学试卷第 4 页(共 10 页)

33. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症诊断,可依据 【 】
- A. 血总钙低于  $1.87\text{mmol/L}$ ( $7.5\text{mg/dl}$ )      B. 有维生素 D 缺乏史  
C. 面神经征阳性      D. 腓神经征阳性  
E. 手痉挛征阳性
34. 腹泻的正确治疗是 【 】
- A. 呕吐严重时,可暂禁食 6—12 小时  
B. 如为病毒性肠炎,以调整饮食和支持疗法为主  
C. 改善消化功能,可用助消化药  
D. 若禁食,则同时禁水  
E. 蒙脱石粉(smecta)适用于各型腹泻
35. 学龄儿童肺炎支原体肺炎临床特征 【 】
- A. 起病缓慢      B. 病变以两肺上肺叶为常见  
C. 症状重,体征轻      D. 红、白霉素治疗有效  
E. 热型不定
36. 可引起“肺动脉高压”的先天性心脏病是 【 】
- A. 房间隔缺损      B. 室间隔缺损      C. 法洛四联症  
D. 动脉导管未闭      E. 肺动脉狭窄
37. 肾病综合征的正确治疗是 【 】
- A. 肾病期按期预防接种      B. 以肾上腺皮质激素(泼尼松)治疗为主  
C. 摄入适量蛋白质      D. 频繁复发者,可联合免疫抑制剂  
E. 绝对卧床休息 3 月
38. 特发性血小板减少性紫癜的实验室检查特点为 【 】
- A. 血小板减少      B. 血块收缩不良      C. 凝血时间延长  
D. 骨髓造血功能旺盛      E. 出血时间延长
39. 化脓性脑膜炎的并发症有 【 】
- A. 硬脑膜下积液      B. 脑性低钠血症      C. 脑积水  
D. 颅内出血      E. 脑室管膜炎
40. 控制支气管哮喘发作的治疗是 【 】
- A. 解痉      B. 抗炎      C. 减轻气道粘膜水肿  
D. 呼吸兴奋剂      E. 应用脱水剂

儿科学试卷第 5 页(共 10 页)

## 第二部分 非选择题(共 60 分)

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
|----|-----|-----|
|    |     |     |

### 三、填空题(本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分)

请在每小题的空格中填上正确答案,错填、不填均无分。

41. 婴儿一般于\_\_\_\_\_月时长出第一枚乳牙。
42. 新生儿出血症是因为\_\_\_\_\_缺乏所致。
43. 维生素 D 缺乏时,血钙下降,甲状旁腺功能\_\_\_\_\_,则表现为维生素 D 缺乏性手足搐搦症。
44. 肾病综合征中大量蛋白尿定量标准是至少大于\_\_\_\_\_g/kg·d。
45. 婴幼儿严重贫血时常出现\_\_\_\_\_,而使肝、脾和淋巴结肿大。
46. 21-三体综合征是由\_\_\_\_\_畸变引起的疾病。
47. 以心脏炎为主的风湿热,抗风湿药物应选用\_\_\_\_\_。
48. 结核性脑膜炎脑脊液的典型改变是蛋白质增高,\_\_\_\_\_同时降低。
49. 癫痫持续状态指惊厥发作或反复发作\_\_\_\_\_分钟以上,发作间歇意识不恢复者。
50. 蛔虫有游窜、钻孔及喜碱厌酸的习性,由此引起的并发症为\_\_\_\_\_。

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
|----|-----|-----|
|    |     |     |

### 四、简答题(本大题共 5 小题,每小题 5 分,共 25 分)

51. 简述新生儿溶血病的实验室检查。

52. 简述 8kg 婴儿合并中度低渗性脱水第 1 天静脉补液计划。

53. 患儿,男,6岁,头晕,胸闷2周。查体:心率110次/分,节律不齐,未闻及病理性杂音,肺、腹阴性。既往体健。心电图提示频发室性早搏。血中柯萨奇B病毒特异性抗体IgM阳性。血清肌酸磷酸激酶同工酶(CK-MB)增高。诊断:病毒性心肌炎。请按临床诊断标准,简述其诊断依据。

儿科学试卷第7页(共10页)

54. 简述急性链球菌感染后肾小球肾炎血清补体的变化及意义。

55. 简述营养性缺铁性贫血缺铁经过的三个阶段。



| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
|----|-----|-----|
|    |     |     |

五、病例分析题(本大题共1题,15分)

56. 患儿,男,1岁,以“持续高热3天,咳嗽2天”之主诉入院。3天前无明显诱因出现发热,体温持续波动在30~40°C之间,服用退热药物效果不佳。2天前开始咳嗽,呈阵发性剧咳,并出现气喘,口周发青,逐渐加重。查体:T39°C,R70次/分,烦躁,鼻翼煽动,三凹征(+),口周发绀,双肺可闻及喘鸣音,未闻及湿性罗音。心率198次/分,律齐,心音低钝,未闻及病理性杂音,腹软,肝肋下3cm,质软,脾肋下未触及。神经系统查体阴性。胸部X线示:两肺可见大小不等的片状阴影,部分融合成片状大病灶,血常规示:WBC  $9 \times 10^9/L$ ,N:0.35,L:0.35。

要求:(1)提出诊断(包括可能的病原)

(2)写出诊断依据

(3)治疗计划

2003 年上半年高等教育自学考试全国统一命题考试

儿科学试题参考答案及评分标准

(课程代码 2906)

一、单项选择题(本大题 30 小题,每小题 1 分,共 30 分)

- |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. D  | 2. C  | 3. A  | 4. B  | 5. B  |
| 6. A  | 7. D  | 8. B  | 9. B  | 10. C |
| 11. A | 12. B | 13. C | 14. C | 15. A |
| 16. B | 17. B | 18. D | 19. B | 20. C |
| 21. C | 22. A | 23. B | 24. C | 25. C |
| 26. C | 27. A | 28. B | 29. A | 30. C |

二、多项选择题(本大题共 10 题,每小题 1 分,共 10 分)

- |          |         |           |          |          |
|----------|---------|-----------|----------|----------|
| 31. ABDE | 32. BCD | 33. ABCDE | 34. ABCE | 35. ACDE |
| 36. ABD  | 37. BCD | 38. ABDE  | 39. ABCE | 40. ABC  |

三、填空题(本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分)

- |                   |           |                  |
|-------------------|-----------|------------------|
| 41. 4~10          | 42. 维生素 K | 43. 低下(或未见代偿性增加) |
| 44. 0.1(或 0.05)   | 45. 骨髓外造血 | 46. 常染色体         |
| 47. 肾上腺皮质激素(或泼尼松) | 48. 糖和氯化物 |                  |
| 49. 30            | 50. 胆道蛔虫病 |                  |

四、简答题(本大题共 5 小题,每小题 5 分,共 25 分)

51. 答:①血红蛋白、红细胞下降,未结合胆红素上升;  
②母婴血型鉴定证实血型不合;  
③血清特异性血型抗体检查阳性;红细胞直接抗人球蛋白试验阳性,可确诊 Rh 溶血症;  
抗体释放试验阳性,可确诊 ABO 溶血症。

52. 答:①补液总量:  $8 \times 150 = 1200\text{ml}$   
②补液成分: 2/3 张含钠液(或 3:4:2 液,或 4:3:2 液)  
③补液速度:  $1200 \times \frac{1}{2} = 600\text{ml}$  8 小时静脉滴入  
 $1200 \times \frac{1}{2} = 600\text{ml}$  后 16 小时静脉滴入

③(补液速度):  $\left. \begin{array}{l} 600\text{ml} \quad 8\text{小时内静脉滴入} \\ 600\text{ml} \quad \text{后} 16\text{小时内静脉滴入} \end{array} \right\}$

53. 答:①具有2项主要指标:心电图示心律失常;血清CK-MB增高;

②具有1项次要指标:头胀;胸闷;

③病原学依据:柯萨奇B病毒特异性抗体IgM阳性

病毒性心肌炎确诊条件:(1)具有主要指标2项或主要指标1项及次要指标2项者  
(2)病原学(依据)指标1项。

54. 答:血清总补体及C<sub>3</sub>在急性期降低,多于病后4~8周恢复正常,持续低补体应考虑其他类型肾炎。

55. 答:①铁减少期

②制造红细胞铁缺乏期

③缺铁性贫血期

五、案例分析题(共1题,15分)

36. 答:诊断:腺病毒肺炎合并心力衰竭(或心衰)

诊断依据:①高热,年龄在6~24月间,WBC  $9 \times 10^9/L$ ,N:0.35,L:0.65

②咳嗽、气喘,肺部体征仅闻及喘鸣,胸部X—线示两肺片状影或大病灶。

③烦躁、呼吸困难(或鼻翼煽动、三凹征+),心率198次/分(或 $>180$ 次/分),呼吸70次/分(或 $>60$ 次/分),肝大(或肝肋下3cm)

治疗计划:①抗感染(或抗病毒)

②吸氧

③镇静(或镇静剂药名)

④强心(或洋地黄药名)

⑤利尿(或利尿剂药名)

儿科学试题参考答案及评分标准第2页(共2页)