

全国 2019 年 10 月高等教育自学考试  
儿科护理学(二)试题  
课程代码:03011

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 反映儿童体格生长和营养状况的敏感指标是
  - A. 身高
  - B. 体重
  - C. 头围
  - D. 胸围
2. 小儿前囟闭合的时间为生后
  - A. 1~2 个月
  - B. 3~4 个月
  - C. 8~10 个月
  - D. 12~18 个月
3. 一健康小儿,前囟约 2×2cm,牙齿已萌出,身长 65cm,体重 7.2kg,可独坐片刻,能发辅音,其月龄大约是
  - A. 6 个月
  - B. 8 个月
  - C. 10 个月
  - D. 12 个月
4. 婴儿最早添加的辅食应该是
  - A. 蛋黄
  - B. 米粉
  - C. 菜泥
  - D. 水果泥
5. 2 岁小儿接种乙脑减毒活疫苗后当晚出现发热,体温 37.9℃,伴精神弱。此时应采取的措施是
  - A. 立即给予退热剂
  - B. 立即到医院就诊
  - C. 服用抗感冒药物
  - D. 休息,多饮水

6. 百白破疫苗的初种年龄是生后  
A. 1 个月 B. 2 个月  
C. 3 个月 D. 4 个月

7. Wong-Baker 疼痛评估脸谱表的适用年龄是  
A. 0~1 岁 B. 1~2 岁  
C. 2~3 岁 D. 3 岁以上

8. 新生儿硬肿的首发部位是  
A. 面颊 B. 上肢  
C. 臀部 D. 下肢外侧

9. 新生儿肺透明膜病的主要病因是  
A. 产后感染 B. 产时窒息  
C. 原发性肺不张 D. 缺乏肺泡表面活性物质

10. 患儿男，7 个月，诊断为维生素 D 缺乏性佝偻病，此时患儿的骨骼改变可能出现  
A. 方颅 B. 肋缘外翻  
C. 脊柱侧弯 D. “O”型腿

11. 患儿男，2 岁，咳嗽 3 天，体温 38℃，双肺可闻及干性及不固定湿啰音，应首先考虑的诊断是  
A. 支气管肺炎 B. 急性支气管炎  
C. 支气管异物 D. 急性上呼吸道感染

12. 将 200ml 生理盐水和 100ml 1.4%NaHCO<sub>3</sub> 溶液混合，其混合液的张力为  
A. 等张 B. 2/3 张  
C. 1/2 张 D. 1/3 张

13. 患儿，10 个月，腹泻 2 天，精神萎靡，皮肤弹性差，前囟凹陷，口腔黏膜干燥，尿量较少。判断该患儿脱水程度为  
A. 轻度 B. 中度  
C. 重度 D. 极重度

14. 患儿女，2 岁，腹泻补液后脱水基本纠正，但精神弱、四肢无力、腱反射减弱、心音低钝。考虑该患儿可能发生了  
A. 低钾血症 B. 低钙血症  
C. 低镁血症 D. 低血糖

15. 动脉导管未闭患儿当肺动脉压力超过主动脉时，出现的青紫部位是  
A. 右上肢                           B. 左上肢  
C. 头面部                           D. 下半身
16. 患儿男，1岁2个月，因咳嗽2天伴气促1天，以支气管肺炎、先天性心脏病收住院。查体：生长发育落后；呼吸50次/分，双肺细湿啰音；心界向左下扩大，心率160次/分，胸骨左缘第3~4肋间有VI级粗糙收缩期杂音；腹软，肝肋下2cm。该患儿目前正确的护理措施是  
A. 多喂水                           B. 取平卧位  
C. 勤翻身拍背                     D. 控制输液速度
17. 病毒性心肌炎患儿在急性期应至少卧床休息至热退后  
A. 1~2周                           B. 3~4周  
C. 5~6周                           D. 7~8周
18. 患儿女，7岁，近期全身多处出现散在针尖样皮疹，诊断为特发性血小板减少性紫癜，治疗的首选药物是  
A. 阿司匹林                        B. 肾上腺皮质激素  
C. 新鲜血浆                        D. 血小板制剂
19. 患儿男，诊断为急性白血病，应用环磷酰胺治疗，其最常见的副作用是  
A. 肝功能损害                     B. 肾功能损害  
C. 出血性膀胱炎                   D. 周围神经炎
20. 患儿男，5岁，以肾病综合征入院。面部、双下肢及阴囊水肿明显。化验检查：尿蛋白（+++），血胆固醇升高，血浆蛋白降低。目前该患儿首优的护理问题是  
A. 排尿异常                        B. 活动无耐力  
C. 体液过多                        D. 有感染的危险
21. 急性肾小球肾炎患儿恢复正常活动的标准是  
A. 血压正常                        B. 尿常规正常  
C. 血沉正常                        D. 尿Addis计数正常
22. 患儿，2岁，以化脓性脑膜炎入院，出现意识不清，呼吸不规则，两侧瞳孔不等大，对光反射迟钝。该患儿最可能发生了  
A. 脑室管膜炎                     B. 脑脓肿  
C. 脑疝                             D. 脑积水

23. 出生时即存在且维持终生的神经反射是  
A. 腹壁反射                           B. 提睾反射  
C. 角膜反射                           D. 拥抱反射
24. 川崎病的特征性临床表现是  
A. 皮疹                               B. 指端膜样脱屑  
C. 发热                               D. 眼球结膜充血
25. 先天性甲状腺功能减退症患儿给予甲状腺素片治疗，应维持至  
A. 终生治疗                           B. T<sub>4</sub> 和 TSH 正常后停药  
C. 青春期停药                       D. 症状控制即可停药
26. 患儿女，10个月，结核菌素试验（+++），最有可能的是  
A. 母亲有结核病                   B. 曾患过结核病  
C. 体内有活动性结核灶           D. 出生时接种过卡介苗
27. 接触水痘的易感儿检疫期应为  
A. 5天                               B. 7天  
C. 14天                              D. 21天
28. 早期发现麻疹最有价值的依据是  
A. 呼吸道卡他症状               B. 躯干有皮疹  
C. 颈部淋巴结肿大                D. 麻疹黏膜斑
29. 患儿因颅内出血入院，已出现脑疝前驱症状，应采取的体位是  
A. 平卧                              B. 头部抬高 5° ~ 10°  
C. 头部抬高 15° ~ 20°           D. 头部抬高 25° ~ 30°
30. 患儿皮肤接触毒鼠药中毒，宜选取的冲洗液是  
A. 清水                              B. 食用醋  
C. 肥皂水                           D. 10%碳酸氢钠

# 非选择题部分

## 注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

## 二、填空题：本大题共 10 空，每空 1 分，共 10 分。

31. 正常小儿会爬行的月龄是\_\_\_\_\_个月。
32. 新生儿从母体通过胎盘获得的免疫球蛋白是\_\_\_\_\_。
33. 急性感染性喉炎以\_\_\_\_\_、声嘶、喉鸣和\_\_\_\_\_为临床特征。
34. 小儿轻型腹泻以\_\_\_\_\_症状为主，无\_\_\_\_\_和全身中毒症状。
35. 心力衰竭患儿每次应用洋地黄前应测量\_\_\_\_\_。
36. 急性肾小球肾炎最早出现的症状是\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
37. 脉压增大伴有周围血管征的先天性心脏病是\_\_\_\_\_。

## 三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

38. 学龄期
39. 人工被动免疫
40. 治疗性的游戏
41. 早产儿
42. 贫血

## 四、简答题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

43. 简述光照疗法的护理常规。
44. 简述单纯性肥胖小儿饮食管理措施。
45. 简述法洛四联症患儿缺氧发作时的处理措施。
46. 简述小儿营养性缺铁性贫血的原因。
47. 简述过敏性紫癜患儿腹痛的护理要点。

## 五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

48. 患儿女，9 个月，发热、咳嗽 2 天，今日哭闹烦躁，咳嗽加重、痰多就诊。查体：体温 38.9℃，心率 182 次/分，呼吸 65 次/分。面色苍白，呼吸急促、可见鼻翼扇动及三凹征，口周发绀，双肺可闻及哮鸣音及细湿啰音，心音低钝，肝肋下 3.5cm。血常规 WBC11×10<sup>9</sup>/L，胸片可见右下肺片状阴影。

请根据以上资料回答：

- (1) 该患儿最可能的临床诊断。
- (2) 该患儿 3 个主要护理问题。
- (3) 该患儿主要护理措施。

49. 患儿男，8岁，2周前无明显诱因出现多饮、多尿，尿量达3000~4000ml/d。食欲稍有增加，容易饥饿，发病以来无其它异常，体重减轻约1.5kg。入院实验室检查：尿葡萄糖（+++），尿酮体（+）；空腹血糖11mmol/L，餐后2小时血糖15mmol/L，糖化血红蛋白12.1%；抗谷氨酸抗体阳性。临床诊断为1型糖尿病，入院后给予胰岛素注射治疗。

请根据以上资料回答：

- (1) 患儿饮食管理的原则。
- (2) 胰岛素的使用方法。